

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe 0

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>0</b>	Unzureichendes Material	Abstrich-Wiederholung	Unsatisfactory for evaluation

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe I

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>I</b>	Unauffällige und unverdächtige Befunde	Abstrich im Vorsorgeintervall	NILM = negative for intraepithelial lesion or malignancy

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe II(1)

Befunde mit eingeschränktem protektivem Wert

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>Ila</b>	Unauffällige Befunde bei auffälliger Anamnese	Ggf. zytologische Kontrolle wegen auffälliger Anamnese (zytologischer/histologischer/kolposkopischer/klinischer Befund)	NILM

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe II(2)

Befunde mit eingeschränktem protektivem Wert

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>II-p</b>	Plattenepithelzellen mit geringergradigen Zellveränderungen als bei CIN 1, auch mit koilozytärem Zytoplasma/Parakeratose	Ggf. zytologische Kontrolle unter Berücksichtigung von Anamnese und klinischem Befund (evtl. nach Entzündungsbehandlung und/oder hormoneller Aufhellung; in besonderen Fällen additive Methoden und/oder Kolposkopie	ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance)

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe II(3)

Befunde mit eingeschränktem protektivem Wert

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>II-g</b>	Zervikale Drüsenzellen mit Anomalien, die über das Spektrum reaktiver Veränderungen hinausreichen	Ggf. zytologische Kontrolle in Abhängigkeit von Anamnese und klinischem Befund (evtl. nach Entzündungsbehandlung; in besonderen Fällen additive Methoden und/oder Kolposkopie)	AGC endocervical NOS (atypical glandular endocervical cells)

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe II(4)

Befunde mit eingeschränktem protektivem Wert

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>II-e</b>	Endometriumzellen bei Frauen > 40. Lebensjahr in der zweiten Zyklushälfte	Klinische Kontrolle unter Berücksichtigung von Anamnese und klinischem Befund	Endometrial cells

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe III(1)

Unklare bzw. zweifelhafte Befunde

Gruppe	Definition	Empfehlung	Korrelat Bethesda-System 2001
<b>III-p</b>	CIN 2/3 bzw. Plattenepithel- karzinom nicht auszuschließen	Differenzialkolposkopie, ggf. additive Methoden, evtl. kurzfristige zytologische Kontrolle nach Entzündungsbehandlung und/oder hormoneller Aufhellung	ASC-H (atypical squamous cells of undetermined significance cannot exclude HSIL )

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe III(2)

Unklare bzw. zweifelhafte Befunde

Gruppe	Definition	Empfehlung	Korrelat Bethesda-System 2001
<b>III-g</b>	Ausgeprägte Atypien des Drüsenepithels, Adenocarcinoma in situ/invasives Adenokarzinom nicht auszuschließen	Differenzialkolposkopie, ggf. additive Methoden	AGC endocervical favor neoplastic



# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe III(4)

Unklare bzw. zweifelhafte Befunde

Gruppe	Definition	Empfehlung	Korrelat Bethesda-System 2001
III- x	Zweifelhafte Drüsenzellen ungewissen Ursprungs	Weiterführende Diagnostik (z.B. fraktionierte Abrasio; ggf. additive Methoden/Differenzialkol poskopie	AGC favor neoplastic

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe IIID(1)

Dysplasie – Befunde mit größerer Regressionsneigung

Gruppe	Definition	Empfehlung	Korrelat Bethesda-System 2001
IIID1	Zellbild einer leichten Dysplasie analog CIN 1	Zytologische Kontrolle in 6 Monaten, bei Persistenz > 1 Jahr: ggf. additive Methoden/Differenzialkolposkopie	LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion)

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe IIID(2)

Dysplasie – Befunde mit größerer Regressionsneigung

Gruppe	Definition	Empfehlung	Korrelat Bethesda-System 2001
<b>IIID2</b>	Zellbild einer mäßigen Dysplasie analog CIN 2	Zytologische Kontrolle in 3 Monaten, bei Persistenz > 6 Monate: Differenzialkolposkopie, ggf. additive Methoden	HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion)

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe IV(1)

Unmittelbare Vorstufen des Zervixkarzinoms

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>IVa - p</b>	Zellbild einer schweren Dysplasie/eines Carcinoma in situ analog CIN 3	Differenzialkolposkopie und Therapie	HSIL

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe IV(2)

Unmittelbare Vorstufen des Zervixkarzinoms

Gruppe	Definition	Empfehlung	Korrelat Bethesda-System 2001
<b>IVa-g</b>	Zellbild eines Adenocarcinoma in situ	Differenzialkolposkopie und Therapie	AIS

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe IV(3)

Unmittelbare Vorstufen des Zervixkarzinoms

Gruppe	Definition	Empfehlung	Korrelat Bethesda-System 2001
<b>IVb-p</b>	Zellbild einer CIN 3, Invasion nicht auszuschließen	Differenzialkolposkopie und Therapie	HSIL with features suspicious for invasion

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe IV(4)

Unmittelbare Vorstufen des Zervixkarzinoms

Gruppe	Definition	Empfehlung	Korrelat Bethesda-System 2001
<b>IVb-g</b>	Zellbild eines Adenocarcinoma in situ, Invasion nicht auszuschließen	Differenzialkolposkopie und Therapie	AIS with features suspicious for invasion

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe V(1)

### Malignome

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>V - p</b>	Plattenepithelkarzinom	Weiterführende Diagnostik mit Histologie und Therapie	Squamous cell carcinoma



# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe V(2)

### Malignome

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>V - g</b>	Endozervikales Adenokarzinom	Weiterführende Diagnostik mit Histologie und Therapie	Endometrial adenocarcinoma

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe V(3)

### Malignome

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>V - e</b>	Endometriales Adenokarzinom	Weiterführende Diagnostik mit Histologie und Therapie	Endometrial adenocarcinoma

# Münchener Nomenklatur III

## Gruppe V(4)

### Malignome

<b>Gruppe</b>	<b>Definition</b>	<b>Empfehlung</b>	<b>Korrelat Bethesda-System 2001</b>
<b>V - x</b>	Andere Malignome, auch unklaren Ursprungs	Weiterführende Diagnostik mit Histologie und Therapie	Other malignant neoplasms

# Münchener Nomenklatur III

## Zusammenfassung der aktuellen Empfehlungen

<b>Gruppe</b>	<b>Empfehlung</b>
<b>0</b>	Abstrich-Wiederholung
<b>I</b>	Abstrich im Vorsorgeintervall (12 Monate)
<b>II</b>	Ggf. zytologische Kontrolle nach Anamnese und Klinik
<b>III</b>	Differenzialkolposkopie, ggf. mit zytologischer Kontrolle oder Histologie
<b>IIID</b>	Zytologische Kontrolle in 3 bzw. 6 Monaten
<b>IV</b>	Differenzialkolposkopie, (Histologie) und Therapie
<b>V</b>	Histologie und Therapie